

Behandling af føl

Føl bør behandles 4 gange i deres første leveår.

1. behandling når føllet er 2-3 måneder gammelt.
Behandlingen bør ikke baseres på resultatet af en gødningsprøve. Føllet er med stor sikkerhed inficeret. Men ormene er endnu ikke påbegyndt æglægning og en gødningsprøve er derfor ikke pålidelig. Første behandling skal rettes mod spolorm, som er særdeles sygdoms fremkaldende hos føl.
2. behandling når føllet fravendes
Behandlingen bør baseres på en gødningsprøve for at fastslå om behandlingen skal rettes mod spolorm eller strongylider.
3. og 4. behandling når føllet er 9 og 12 måneder. Begge behandlinger bør baseres på en gødningsprøve og undersøgelse for bændelorm bør minimum foretages den ene gang af de to sidste behandlinger.

Normalt kan/ må man ikke behandle uden, at der er stillet en diagnose. Loven* giver dog mulighed for at undtage i særlige tilfælde. Føl er et sådan særligt tilfælde i det vi ved at føllet med stor sandsynlighed er inficeret og vi ved at en diagnose ikke er mulig at stille på sædvanligvis.

Forudsætningen for at behandle "i særlige tilfælde" er at der bliver ført optegnelse med begrundelsen for undtagelsen.

Du skal derfor benytte vores særlige rekvisition til føl:

<http://equilab.dk/onewebmedia/Rekvisition%20f%C3%B8l%20300315.pdf>

*Antiparasitære lægemidler må i helt særlige tilfælde, hvor der er en veterinærfaglig begrundelse herfor, anvendes, udleveres eller ordineres uden forudgående konstateret parasitbelastning. Dyr lægen skal i disse tilfælde føre optegnelser, der begrundes anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.